

Raps – Spritzplan 2021

Fleischmann Pius
Hauptstrasse 26
8580 S
Natel 079 / 816 84 73
pius.fleischmann@omya.com

Kunde: _____
Adresse: _____
Wohnort: _____



<https://www.screencast.com/t/UC8JfpAT>

	Problem / Zeitpunkt	Wirkungs-Schwerpunkte	Produkt	Bedarf / ha	Bedarf	Bemerkung
		Herbst - Behandlungen		Fläche		ha
Herbst		Schneckenfrass	Schnecken-Linsen oder Steiner Gold	3 kg 5 kg		beim Auflaufen (Schnecken-Frass beachten)
	Voraufbau (Direkt nach der Saat)	Unkraut (leichten Boden)	Colzor Trio*	3.5 l	*	sofort nach der Saat (nicht einarbeiten)
		Unkraut (schweren Boden)	Colzor Trio*	4.0 l	*	
	Vor- oder Nachaufbau BBCH 00-18	Unkraut und Ungräser (stark auf Klebern)	Solanis	1.5 l	*	Im VA stärkere Wirkung. Im NA Kombination mit Erdflöhen- Bekämpfung möglich.
			+ Bredola	1 l	*	
	Nachaufbau Korrekturbehandlung	Hirschen, Ausfallgetreide	Gallant 535	0.5 l		nach dem Auflaufen der Gräser / Ausfallgetreide
		Raigras, Quecken	Gallant 535	1.0 l		
Fungizid / Verkürzen	Wurzelhals-/Stängelfäule (Phoma)	Sirocco*	1.5 l	*	6-8 Blatt-Stadium	
	Blattdünger Mg + B + S	+ Epsa Bortop	10 kg			
Beim Überschreiten der Schadschwelle	Rapserrfloh, Rapsblattwespenlarven	Fury 10 EW*	0.1 l	*	Sonderbewilligung notwendig! Erdflöhen BSS: > 50% im Keimblatt > 80% ab 4-Blatt Wespenlarve BSS: 1-2 Larven / Pfl.	
		oder Aligator*	0.3 l	*		
	PH-Puffer / P-Dünger	+ Complezal P Max	1 l			

	Frühjahrs – Behandlungen		Fläche	ha		
Frühjahr	Korrekturbehandlung in Frühjahr (Unkraut)	durchgebrochene Unkräuter	Effigo*	0.35 l	*	Frühjahr bis BBCH 50 (Knospen noch nicht offen!!) Mischbar mit Decis, Blocker
	Fungizid / Verkürzen	Wurzelhals-/Stängelfäule (Phoma) + Sclerotinia-Fäule	Casac oder Caryx*	1 l	*	mischbar mit Decis, Blocker, Reldan 22 (jedoch nicht mit Effigo mischen)
	1. Behandlung (Stängelrüssler / Glanzkäfer)	Stängelrüssler + Glanzkäfer	Blocker *	0.2 l	*	Blocker (Pyrethroide) wirkt gut bei kühlen Temperaturen (8-15°) (Bienen giftig)
		PH-Puffer / P-Dünger	+ Complezal P Max	1.5 l		
		Haftmittel	+ Microplant	2 l		
	2. Behandlung (Glanzkäfer)	Rapsglanzkäfer	Ammate	0.17 l		(Ammate = Bienen giftig)
			oder Gazelle 120 FL	0.25 l		Bei allen Insektiziden den Befall / Schadschwelle protokollieren!!
		Netzmittel / Spurennährstoffe	+ Microplant	2 l		
	Blattdünger Mg + B + S	+ Epsa Bortop	10 kg			
	3. Behandlung (Glanzkäfer)	Rapsglanzkäfer	Biscaya* oder Audienz	0.3-0.4 l 0.2 l	*	bis BBCH 59 (vor Beginn der Blüte) Biscaya: (mit Teilwirkung auf Schotengallmücke) Audienz: (Bienen giftig) (mit etwas länger anhaltender Wirkung) Propulse: (verbessert die Platzfestigkeit der Schoten)
Rapskrebs (Sclerotinia)		Propulse	1 l			
Netzmittel / Spurennährstoffe		+ Microplant	2 l			
Blattdünger Mg + B + S		+ Epsa Bortop	10 kg			

Düngergaben im Raps			
Zeitpunkt	Dünger	Menge/ha	Bemerkung
Herbst vor Pflug und Saat	Gülle	30-40 m ³ /ha	Vorkultur beachten (viel Stroh = grösserer N-Bedarf) N-Herbstgabe bis ca. 40 kg/ha ist empfehlenswert
oder Herbst vor der Saat	Plüßfert Campo 5.10.30.+7S	6-7 kg/Are	
1. N-Gabe (Vegetationsbeginn)	Ammonsalpeter	2 kg/Are	Auf eine gute Schwefelversorgung achten. (Schwefelbedarf ca. 60-80 kg/ha)
2. N-Gabe (ca. 1 Woche später)	Entec 26 (26N + 13S)	3-4 kg/Are	

Produkte mit Anwendungs-Auflagen	SPe 1 (Wirkstoff-Mengen-Einschränkungen)	SPe 2 (Anwendungs-Verbote)			SPe 3 (Wasser-Abstands-Auflagen)	
	Einsatz / Jahr (Jahre)	S2	Sh	Karst	Abdrift	Abschwemm
Biscaya, Caryx	-	-	-	-	6 m	1 Punkt
Colzor Trio, Effigo	max. 0.75 kg Dimathachlor / ha / 3 Jahre	X	-	-	6 m	-
Sirocco, Gazelle 120 FL	-	-	-	-	20 m	-
Bredola	max. 1 kg Metazachlor (2 kg Bredola) / Parzelle / 3 Jahre	X	-	-	6 m	2 Punkte
Solanis	max. 250 g Quinmerac (1.5 l Solanis) / Parzelle / 2 Jahre	X	X	X	-	-
Aligator (0.3 l/ha)	-	-	-	-	50 m	1 Punkt
Fury 10 EW, Blocker	-	-	-	-	100 m	1 Punkt